


# LIRAGLUTIDE




Een zeer hoog risico op HVZ wordt gedefinieerd als:

1. Eerder bewezen HVZ; en/of
2. Chronische nierschade

1: Metformine en het sulfonylureumderivaat dienen in de maximaal verdraagbare dosering gebruikt te worden. Bij een intolerantie kan de maximaal verdraagbare dosering dus 0 mg zijn. In dat geval moet het middel wel zijn geprobeerd in het verleden.

2: Er bestaat vergoeding voor gebruik in combinatie met alle andere anti-diabetica, waaronder SGLT2-remmers, behalve in combinatie met een DPP4-remmer. Wanneer de liraglutide in combinatie met een DPP4-remmer wordt voorgeschreven, wordt de DPP4-remmer niet vergoed.

# GLP1-agonisten: SEMAGLUTIDE, DULAGLUTIDE En EXENATIDE




Een zeer hoog risico op HVZ wordt gedefinieerd als:  
1. Eerder bewezen HVZ; en/of  
2. Chronische nierschade

1: Metformine en het sulfonylureumderivaat dienen in de maximaal verdraagbare dosering gebruikt te worden. Bij een intolerantie kan de maximaal verdraagbare dosering dus 0 mg zijn. In dat geval moet het middel wel zijn geprobeerd in het verleden.

2: Er bestaat vergoeding voor gebruik in combinatie met alle andere anti-diabetica, waaronder SGLT2-remmers, behalve in combinatie met een DPP4-remmer. Wanneer de GLP1-agonist in combinatie met een DPP4-remmer wordt voorgeschreven, wordt de DPP4-remmer niet vergoed. Bij exenatide geldt dat enkel Bydureon® is geregistreerd voor deze indicatie, Byetta® niet.

# GLP1-agonisten: LIXISENATIDE



Een zeer hoog risico op HVZ wordt gedefinieerd als:  
1. Eerder bewezen HVZ; en/of  
2. Chronische nierschade

1: Metformine en het sulfonylureumderivaat dienen in de maximaal verdraagbare dosering gebruikt te worden. Bij een intolerantie kan de maximaal verdraagbare dosering dus 0 mg zijn. In dat geval moet het middel wel zijn geprobeerd in het verleden.