

Midline (Hoofd-Hals, Thorax, Genitaal gebied)



LET OP:

download eerst dit bestand
voordat je het invult.

Type compressiehulpmiddel (keuzes)

meerdere antwoorden mogelijk

Zwachtel/bandage

GPD

ACD

HH

Thorax

Polster / pelotten / PPD

Anders:

Toelichting (verplicht):

Aangedane lichaamslocatie

meerdere antwoorden mogelijk

Hoofd / Hals

Thorax / Borst

Buik

Genitaal gebied

Links

Rechts

Beiderzijds

Niet van toepassing

Verstrekking

Machtiging

Datum laatste levering

Draagadvies

Draagduur

< 3 weken

> 3 weken -< 6 mnd

> 6 mnd

Anders:

Tijdstip

Dag

Nacht

Dag en Nacht

Stadium en reden aanvraag

Stadium

Initiële fase (reductiefase / behandelfase)

Consolidatie fase (onderhoudsfase)

Reden (*meerdere antwoorden mogelijk*)

Aanvullend te dragen bij:

Anders:

Toelichting (verplicht):

Status

meerdere antwoorden mogelijk

Oedeem is stabiel
Oedeem fluctueert
Recidiverende erysipelas
Fibrose aanwezig
Littekens aanwezig
Anders:

Welke behandelingen worden er, naast de inzet van compressiehulpmiddelen, ingezet?

meerdere antwoorden mogelijk

(Manuele) lymfedrainage
Endermologie
Bewegingstherapie
Participatie bevorderen (werk / sociaal)
(I)PC
Zwachtelen / bandages
Interventies bevordering zelfmanagement
Anders:

Doel van de inzet van het compressiehulpmiddel

meerdere antwoorden mogelijk

Vermindering aantal behandelingen
Stabiele situatie behouden/bereiken
Zelfredzaamheid bevorderen
Reduceren oedeem
Voorkomen recidief
Mobilisatie:

Anders:

Vermindering thuiszorg
Pijnvermindering
Verbeteren bloed-/lymfecirculatie / afvoer
Consolidatie oedeem
Functioneren in de maatschappij bevorderen

Heeft er nader onderzoek plaatsgevonden door de verwijzer

meerdere antwoorden mogelijk



Let op! Onderstaand antwoord(en) is (zijn) géén reden voor afwijzing van de aanvraag

De eerste stap op weg naar een doeltreffende en doelmatige verstrekking van compressiehulpmiddelen is een duidelijke indicatiestelling, zodat de cliënt die compressiehulpmiddelen nodig heeft, ook daadwerkelijk het juiste hulpmiddel geleverd krijgt.

De arts, verpleegkundig specialist of physician assistant vertaalt zijn/haar bevindingen in een functioneringsgerichte verwijzing. Bij enkele indicaties is er nader onderzoek gewenst. Hieronder is een aantal onderzoeksmethoden weergegeven.

Onderzoek

meerdere antwoorden mogelijk

Lymfscintigrafie
Fluoroscopie
Anders:

Géén onderzoek bekend

Verantwoording: incl. stepped care

Medische indicatie

meerdere antwoorden mogelijk

Morbus Morbihan

Anders:

Lipoedeem (geen Zvw aanspraak)

Lymfoedeem

Primair lymfoedeem

Secundair lymfoedeem

Oncologische oorzaak

Trauma

Anders:

Relevante comorbiditeiten o.a.

meerdere antwoorden mogelijk

Decompensatio Cordis

Nierinsufficiëntie

Wond

Bacteriële infecties

Anders:



Zie voor meerdere
comorbiditeiten bijlage 9 Module
Compressiehulpmiddelenzorg
(Generiek Kwaliteitskader
Hulpmiddelenzorg)

Andere complicerende factoren

meerdere antwoorden mogelijk

Ernstige mate van deformatie

Pijn

Meerdere locaties

Krachtverlies

Beperkingen in fysieke activiteiten

Mentale stoornissen

Andere complexiteit(en):

Toelichting (verplicht):

Door wie wordt het compressiehulpmiddel aangebracht?

meerdere antwoorden mogelijk

Zelfstandig
Wijkverpleegkundige
Wondverpleegkundige / -consulent
Mantelzorg
Verzorgende / thuiszorg
Anders:

Welke zorgprofessionals zijn betrokken (geweest)?

meerdere antwoorden mogelijk

Huisarts / Medisch specialist
Wijkverpleegkundige
Wondverpleegkundige / -consulent
Oncologisch verpleegkundige
Compressie-therapeut / Bandagist
Oedeem fysiotherapeut
Huid- en oedeemtherapeut
Anders:

Stepped care vragen: Waarom kan niet worden volstaan met (traditioneel) zwachtelen?

meerdere antwoorden mogelijk

Zwachtelen niet mogelijk door vorm, zwachtels zakken
Zwachtelen is te arbeidsintensief bij deze cliënt
omdat:

Duur en frequentie van zwachtelsessies beperken
omdat:

Zwachtelen te pijnlijk
omdat:

Toelichting (verplicht):



Hoeft alleen te worden
ingevuld in de Initiële fase

Sneller resultaat / snellere genezing / bereiken stabiele situatie
Zorg is niet (voldoende) beschikbaar
Te langdurig zwachtelen (3-6 weken)
Locatie is niet geschikt
Anders: